

INFORMACINIS LAPAS APIE BARTOLINIO LIAUKOS LIGŲ OPERACINIŲ GYDYMĄ

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums yra diagnozuota Bartolinio liaukos cista (-os) arba Bartolinio liaukos pūlinys, todėl Jums turėtų būti atlikta viena iš operacijų:
 - a) Bartolinio liaukos cistos pašalinimas,
 - b) Bartolinio liaukos pūlinio atvėrimas ir drenavimas,
 - c) Bartolinio liaukos cistos marsupializacijos operacija.
2. Bartolinio liaukos – tai liaukutės, esančios giliai po oda vulvos srityje. Jos turi latakus, kuriais išteka vulvą drėkinantis sekretas. Užsikimšus šiam latakui – susiformuoja cista. Bartolinio liaukos cistos pagrindiniai požymiai: elastingas, neskausmingas darinys apatinėje vulvos srityje, kuris laikui bėgant gali didėti, infekuotis – t.y. susiformuoti pūlinys. Bartolinio liaukos pūlinys yra labai skausmingas (trukdo sėdėti, vaikščioti), oda virš jo - paraudusi, gali būti nemalonaus kvapo išskyry, pakilti kūno temperatūra.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI ATSISAKIUS OPERACIJOS

3. Nepašalinta Bartolinio liaukos cista gali supūliuoti ir sukelti būklę, kai bus reikalinga skubi medicininė pagalba (atsiradus pūliniui).
4. Negydant susiformavusio Bartolinio liaukos pūlinio – tenka kentėti skausmą, diskomfortą, pūlinys gali trūkti savaime – ištekės susikaupę pūliai, bus ilgas gijimas. Gali atsirasti sisteminės infekcijos reiškiniai (sepsis) – tokioms būklėms jau bus reikalingas sudėtingas, ilgas stacionarinis gydymas.

OPERACIJOS ESMĒ, POBŪDIS, BŪDAI

5. Operacija atliekama trumpalaikēje bendrinēje nejautroje (nejautrā sukēliantys vaistai suleidžiami ī venā). Apie nejautres metodo detales ir rizikā Jums bus suteikta atskira informacija.
6. Susiformavus Bartolinio liaukos cistai, stengiamasi išsaugoti sveikajā liaukos daļī ir pagal tai, dažniausiai, parenkamas planinēs operācijas būdas: atvērimas, ertmēs drenavimas ar marsupializacija (cistos kraštai išverčiami ir apsiuvami, kad liktų atvira ertmē, negalētų kauptis turinys). Marsupializacija dažniausiai atliekama kartojojantis cistos uždegiminiams procesams.
7. Susiformavus Bartolinio liaukos pūliniui – virš jo įpjaunama oda, išvaloma pūlinio ertmē, paliekamas tamponas – suvilgytas dezinfekuojančiu tirpalu, žaizda nesiuvama.
8. Skiriami keli operacijos būdai:
 - a) Bartolinio liaukos cistos pašalinimas,
 - b) Bartolinio liaukos cistos marsupializacija (kraštų išvertimas),
 - c) Bartolinio liaukos pūlinio atvērimas ir drenavimas.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODAI

9. Galima atlikti Bartolinio liaukos pūlinio punkcijā – išsiurbti jos turinį, tačiau tai tik trumpalaikis gydymo metodas, kadangi turinys vėl susikaupia.
10. Konservatyvus susiformavusio Bartolinio liaukos pūlinio gydymas būtų ilgas, pacientei sukeltų didesnį diskomfortā, dažnai yra neefektyvus, galimos sisteminēs komplikacijos.

GALIMYBĖ KEISTI ĮPRASTOS OPERACIJOS EIGĄ IR APIMTĮ

11. Operacijos būdas, eiga ir apimtis yra aptariama prieš operaciją, tačiau dėl galimų komplikacijų operacijos metu (gausesnio kraujavimo, bendros būklės ar kt.), operacijos būdas, eiga ar apimtis gali keistis.
12. Pasirašydami sutikimą operacijai Jūs galėsite duoti savo sutikimą operuojančiam gydytojui išplėsti operacijos eigą ir apimtį, jeigu operacijos metu būtų nustatytos kitos patologijos, kurias galima išgydyti tos pačios operacijos ir nejaunos metu.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

13. Atliekant šią operaciją, nurodytos komplikacijos pasitaiko retai.
14. Galimos bendros visoms intervencinėms procedūroms būdingos komplikacijos:
 - a) gali susiformuoti kraujo krešuliai kojų kraujagyslėse, dėl to atsiranda skausmai, tinimas, uždegimo reiškiniai; ypatingai retai šie krešuliai gali atitrūkti ir patekti plaučių kraujagysles, sukelti sveikatai ir gyvybei grėsmingą situaciją,
 - b) rūkančioms bei turinčioms viršsvorį pacientėms yra didesnė komplikacijų širdyje ir plaučiuose bei trombozės rizika.
15. Galimos ir konkrečiai su šia operacija susijusios komplikacijos:
 - a) nemalonus kvapo išskyros gali būti kurį laiką, dėl to bus reikalingi kasdieniniai žaizdos perišimai, tampono su dezinfekuojančiu skysčiu keitimas, gali būti skiriamas gydymas antibiotikais,
 - b) skausmingumas operacijos vietoje, kurį laiką bus nepatogu sėdėti, vaikščioti – reikės naudoti vaistus nuo skausmo.
16. Pūlinio ar cistos atsiradimas gali pasikartoti.
17. Operacijos metu ar pooperaciniu periodu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.

POOPERACINĖS REKOMENDACIJOS

18. Jums bus skiriamas nuskausminantis gydymas.
19. Jums gali būti skiriami antibiotikai – svarbu vartoti juos tiksliai kaip nurodyta ir tiek ilgai, kiek nurodyta.
20. Keletą savaičių po operacijos operacinė žaizda gali serozuoti (gali tekėti rusvas skystis) bus pagausėjusios išskyros - rekomenduojama nešioti higieninius įklotus, dažniau juos keisti.
21. Jei buvo atliktas pūlinio atvėrimas – po operacijos žaizdos perrišimus kasdien atliks gydytojas.
22. Kol visiškai nesugis žaizda, nerekomenduojama turėti intymių santykių.
23. Atsiradus naujiems simptomams – sustiprėjus skausmams operacijos vietoje, atsiradus kraujavimui iš žaizdos, pakilus temperatūrai – nedelsiant kreipkitės į savo šeimos gydytoją.